


КОРРЕКЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ МОРЩИН ЛБА

- 1 Начинать работу следует с пальпации и тестирования: нужно определить, при каком смещении покровных тканей будет более значимое изменение всей площади. Оно может быть локальным или достаточно обширным, когда смещается большой пласт ткани в этой зоне. Оценивайте с двух сторон лба последовательно. Задача — внимательно следить за надбровной областью и областью лба в этих зонах. Смещая покровные ткани в разных направлениях, наблюдайте за тем, в какой позиции видна наибольшая корректировка в области лба.



- 2 После точного определения вектора работы переходите к работе с тейпом. Замерьте и отрежьте 4 полоски нужной длины (длина — примерно 1 квадрат, ширина — 2,5 см), закруглите углы. В терапевтической зоне сделайте 2 разреза.
- 3 Полоска будет располагаться в том направлении, которое вы определили при пальпации. Наложите якорь над бровью и, не натягивая тейп, сместите ткани в нужном направлении, после чего зафиксируйте тейп без натяжения.

- 4 Таким же образом рядом наложите вторую аппликацию.



**Без
натяжения**

- 5 С другой стороны лба проделайте те же действия, учитывая, что направление смещения тканей на этой стороне может отличаться.




↓
Время
ношения
8-12
часов

Курс: 10-12 аппликаций каждый день

КОРРЕКЦИЯ МЕЖБРОВНЫХ МОРЩИН

- 1 Начать работу опять же следует с пальпации и тестирования: определите, при каком смещении покровных тканей будет наибольшее изменение всей площади. Ваша задача — слегка растягивать фасциальный футляр в сторону висков.



- 2 Отмерьте и отрежьте 2 полоски тейпа шириной 1 см и длиной 1–1,5 квадрата.
- 3 Наложите якорь на часть вертикальной дуги над переносицей.
- 4 Натяните ткани и наложите тейп без натяжения.
- 5 Так же наложите аппликацию с другой стороны.

Без
натяжения



↓
Время
ношения
8-12
часов